



**West African Ornithological Society
Société d'Ornithologie de l'Ouest
Africain**



**Join the WAOS and support
the future availability of free
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.

If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la
SOOA et soutenez la
disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.

Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.

Warbler *S. melanocephala*, which has been recorded on a few occasions in Niger (Giraudoux *et al.* 1988) but not further south, as there was no trace of a red orbital ring.

The shape, plumage, behaviour, habitat and date (well-documented spring and autumn passage in W Africa, including Nigeria) were consistent with *S. atricapilla* (see Elgood *et al.* 1994). It has also been recorded in Ghana (Dowsett & Forbes-Watson 1993) and occasionally in Niger (Giraudoux *et al.* 1988), but not previously in Benin, nor in Togo (Cheke & Walsh 1996).

My thanks to J.F. Walsh for comments on a draft of this note.

References

- CHEKE, R.A. & WALSH, J.F. (1996) *The Birds of Togo*. Checklist 14, British Ornithologists' Union, Tring.
- DOWSETT, R.J. & FORBES-WATSON, A.D. (1993) *Checklist of Birds of the Afrotropical and Malagasy Regions*, vol. 1. Tauraco Press, Liège.
- ELGOOD, J.H., HEIGHAM, J.B., MOORE, A.M., NASON, A.M., SHARLAND, R.E. & SKINNER, N.J. (1994) *The Birds of Nigeria*. Checklist 4 (2nd ed.), British Ornithologists' Union, Tring.
- GIRAUDOUX, P., DEGAUQUIER, R., JONES, P.J., WEIGEL, J. & ISENMANN, P. (1988) Avifaune du Niger: état des connaissances en 1986. *Malimbus* 10: 1–140.

Received 12 June 1997

Revised 14 January 1998

Patrick Claffey

B.P. 302, Parakou, Benin

Corrigenda

Partage d'une cavité par deux espèces de calao (Diop, M.S. & Tréca, B. 1997 *Malimbus* 19: 1-6)

Dans notre article sur le partage d'une cavité par deux espèces de calao, une erreur involontaire s'est glissée. En fait l'Ecureuil fouisseur *Xerus erythropus*, souvent appelé à tort Rat palmiste, grimpe très rarement aux arbres, contrairement à l'Ecureuil de Gambie *Heliosciurus gambianus* qui lui est arboricole et peut éventuellement entrer en compétition avec les calaos pour la possession d'une cavité. Nous nous excusons pour cette confusion relevée par M. Babacar Ndao.

Reçu 22 octobre 1997

Moussa Ségala Diop & Bernard Tréca

Laboratoire d'Ornithologie, ORSTOM, BP 1386, Dakar, Sénégal