



**West African Ornithological Society
Société d'Ornithologie de l'Ouest
Africain**



**Join the WAOS and support
the future availability of free
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.
If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la
SOOA et soutenez la
disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.
Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.

Short Notes

Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis*, new to Cameroon

On 30 March 1991 I saw a Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis* at Lake Barombi Mbo, Cameroon. Lake Barombi Mbo is a crater lake surrounded by lowland rainforest near Kumba, South West Province. I saw the bird at 07.00 hours on the Kumba side of the lake. At its nearest it was about 40 m away and was under constant observation between dives for about two minutes before moving out towards the centre of the lake. It was alone but near to a party of six Little Grebes *Tachybaptus ruficollis*. The bird was in predominantly winter plumage although the neck was almost completely black indicating the start of summer plumage. The white breast could be seen underneath. Other features, which set it apart from the Slavonian Grebe *P. auritus*, including the peaked head, upturned bill, and lobe of white extending from the cheeks almost to the crown, could all clearly be seen. The flanks were dirty white with strong dark streaking.

There is no reference to any previous sightings from Cameroon in Brown *et al.* (1982) or Louette (1981).

References

- BROWN, L.H., URBAN, E.K. & NEWMAN, K. (1982) *The Birds of Africa*, Vol 1. Academic Press, London.
- LOUETTE, M. (1981) The birds of Cameroon. An annotated checklist. *Verhandl. Kon. Acad. Wetensch. Lett. Schone Kunst. Belg.* 43: 1-163.

Eddie Williams

17 Sycamore Close, Upton, Wirral, Merseyside L49 4QL, U.K.

Received 3 May 1991

Observation du Grèbe à cou noir au Sénégal

Le statut africain du Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*, est en grande partie inconnu (Brown *et al.*, 1982). Les populations d'Afrique du nord ont décliné pour se limiter aujourd'hui à des migrateurs paléarctiques, alors qu'une population résidente existe en Afrique du sud avec des extensions dans la vallée du Rift. Entre ces deux extrêmes, l'espèce peut se rencontrer avec une distribution discontinue. Au Sénégal seule une observation a été faite jusqu'ici, le 23 déc 1980 par Poorter *et al.* au Parc National des Oiseaux du Djoudj (*dans* Morel & Morel, 1990). Il s'agissait de trois sujets en plumage hivernal d'origine indéterminée.

Nous avons observé d'octobre 1990 à mars 1991 un groupe comptant jusqu'à 34 individus sur une cuvette de lagunage recueillant les eaux usées de la ville de Saint-Louis (15°57'N, 16°28'W). Les caractéristiques de ce site d'environ 3 ha correspondent aux besoins de l'espèce: eaux riches en matière organique et vie aquatique (insectes, mollusques), peu profondes, en grande partie libres de toute végétation (Cramp *et al.*, 1977). Malgré sa faible largeur (100 m), sa protection par un grillage périphérique était un atout supplémentaire pour ces oiseaux relativement farouches.

Pendant la période considérée, ce site a également été occupé par une population importante de Grèbes castagneux *Podiceps ruficollis* (100 à 150), de Canards souchet *Anas clypeata*, Pilets *Anas acuta*, et Sarcelles d'été *Anas querquedula*, et de Flamants roses *Phoenicopterus ruber*, venant s'y nourrir principalement la nuit.

Le groupe de Grèbes à cou noir comportait des oiseaux adultes, certains présentant encore un plumage nuptial à leur arrivée. Après l'avoir perdu pendant leur séjour, l'ensemble des oiseaux l'avait retrouvé avant leur départ. Leur période de séjour et cette évolution du plumage suggèrent un hivernage de sujets paléarctiques et donc une extension de leur zone habituelle de migration à partir du Maghreb.

Les variations d'effectifs ont été parfois brutales (de neuf le 2 décembre à 25 le lendemain) et relativement fréquentes pendant les mois de janvier et février (entre 24 et 34). Elles laissent supposer l'existence d'une autre zone d'hivernage dans la région, qui reste à déterminer si ce phénomène migratoire se reproduit l'an prochain. L'effectif a monté de deux le 13 octobre à 24 le 10 novembre (pas d'observations entre ces dates) et a tombé de 26 le 16 février à trois le 16 mars (également, pas d'observations entre ces dates). Il serait nécessaire de préciser la dynamique d'arrivée et de départ de ces oiseaux, à partir d'observations plus régulières à ces périodes.

References

- BROWN, L.H., URBAN, E.K. & NEWMAN, K. (1982) *The Birds of Africa*, Vol. 1. Academic Press, London.
- CRAMP, S. (éd.) (1977) *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa*, Vol. 1. Oxford University Press, Oxford.
- MOREL, G.J. & MOREL, M.Y. (1990) *Les Oiseaux de Sénégal*. ORSTOM, Paris.

Philippe Bailleul et Pierre-Yves Le Gal
BP 186, Saint-Louis, Sénégal

Reçu 4 juin 1991