



**West African Ornithological Society
Société d'Ornithologie de l'Ouest
Africain**



**Join the WAOS and support
the future availability of free
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.
If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la
SOOA et soutenez la
disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.
Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.

Short Notes

Nouvelles données de distribution pour deux espèces d'oiseaux au Burkina Faso

Au cours d'un séjour de mai 1992 à février 1993 dans le Yatenga, au nord du Burkina Faso, nous avons eu l'occasion de faire de nombreuses observations ornithologiques. Parmi les 250 espèces rencontrées, deux ont retenu notre attention car leur présence dans cette région ne correspond pas à l'aire de répartition connue à ce jour.

Le Martinet marbré *Tachymarpis aequatorialis*. Cette espèce a été observée à cinq reprises. Un groupe de 30 individus chassaient le 8 juin 1992 au dessus d'une savane sèche et boisée un peu nord du village de Thou (13°55'N, 2°46'O) proche de la frontière malienne; un deuxième groupe d'importance similaire a été vu dans la même zone le 11 juillet 1992 ainsi qu'un individu isolé le 20 août sur un point légèrement plus au nord (14°5'N, 2°43'O). Les 29 juillet et 2 août 1992, deux individus évoluaient en compagnie de dix Martinets pâles *Apus pallidus* au dessus du village de Sabouna situé au sud-est de la première zone (13°47'N, 2°20'O). Fin février 1993, un groupe de cinq individus a été observé au dessus du lac de barrage de Thiou, situé à 20 km au sud du village de Thou mentionné plus haut. Dans tous les cas, nous avons bien pu observer ces grands martinets à la poitrine et au ventre finement barrés, ne laissant aucun doute sur leur identité. Nous n'avons par contre pas pu déterminer la sous-espèce. Ces observations s'ajoutent à celles de Côte d'Ivoire (Thiollay 1985), du Togo (Walsh *et al.* 1990), du Sénégal en 1986 et de Guinée en 1988 (Devisse 1992), qui sont toutes situées en dehors de l'aire de nidification connue en Afrique de l'Ouest. Cette espèce est en effet considérée comme localisée dans le nord de la Sierra Leone et au sud-est du Ghana (Fry *et al.* 1988). La répétition, sur quelques mois, de nos observations dans une zone relativement restreinte peut suggérer l'existence d'une population nicheuse dans la région, plutôt que celle d'un erratisme saisonnier. La falaise de Bandiagara au Mali, à une centaine de km plus au nord-ouest, pourrait convenir au Martinet marbré.

Le Grand Calao d'Abyssinie *Bucorvus abyssinicus*. Un mâle a été vu le 3 juin aux environs du village de Sollé (14°7'N, 2°6'O) tandis qu'un autre a été observé le 15 octobre près du village de Kān (14°2'N, 2°45'O) (J. Ogier com. pers.). Pour le Burkina Faso, cette espèce semble avoir été citée une fois en région de savane à la frontière avec le Bénin (Green & Sayer 1979) tandis qu'un couple a été observé au nord-est de Ouagadougou en juillet 1977 par L.D.C. Fishpool (*fade* R.A. Cheke). Dans les pays voisins, l'espèce est mentionnée dans le Parc du W au Niger (Koster & Grettenberger 1983), la Boucle du Baoulé au Mali (de Bie & Morgan 1989) et le nord-est du Bénin (R.A. Cheke com. pers.). Elle semble plus abondante en Côte d'Ivoire (Thiollay 1985) et au Ghana (Grimes 1987). Nos observations réalisées plus au nord ainsi que celles de Duhart & Descamps (1963) pour le delta du Niger au Mali complètent donc les données précédentes pour la zone sahélienne. L'espèce n'est donc pas, comme le suggèrent Fry *et al.* (1988), absente le long d'un axe est-ouest entre la Sénégalie et le Nigéria.

Bibliographie

- DE BIE, S. & MORGAN, N. (1969) Les oiseaux de la Réserve de la Biosphère "Boucle du Baoulé", Mali. *Malimbus* 11: 41-60.
- DEVISSE, R. (1992) Première observation au Sénégal du Martinet marbré *Tachymarpis aequatorialis*. *Malimbus* 14: 16.
- DUHART, F. & DESCAMPS, M. (1963) Notes sur l'avifaune du delta central nigérien et régions avoisinantes. *Oiseau Rev. fr. Orn.* 33 (No. spécial): 1-107.
- FRY, C.H., KEITH, S. & URBAN, E.K. (1988) *The Birds of Africa*, vol. 3. Academic Press, London.
- GREEN, A.A. & SAYER, J. (1979) The birds of the Pendjari and Arli National Parks (Benin & Upper Volta). *Malimbus* 1: 14-28.
- GRIMES, L.G. (1987) *The Birds of Ghana*. Checklist 9, British Ornithologists' Union, London.
- KOSTER, S.H. & GRETENBERGER, J. (1983) A preliminary survey of birds in park W, Niger. *Malimbus* 5: 62-72.
- THIOLLAY, J.M. (1985) The birds of Ivory Coast: status and distribution. *Malimbus* 7: 1-59.
- WALSH, J.F., CHEKE, R.A. & SOWAH, S.A. (1990) Additional species and breeding records of birds in the republic of Togo. *Malimbus* 12: 2-18.

Reçu 27 janvier 1993

Revu 15 juin 1993

Gilles Balança & Marie-Noël de Visscher
CIRAD/GERDAT/PRIFAS, BP 5035, 34032 Montpellier, France

The status of the Black Swift *Apus barbatus* in western West Africa

West of Cameroon, the Black Swift *Apus barbatus* is known from two skins, one taken at Obudu Plateau, Nigeria, and the other at Rokupr, Sierra Leone (Mackworth-Praed & Grant 1970, Fry *et al.* 1988). There are no published sightings west of Nigeria (Elgood 1982). The following observations of dark swifts by the author in Sierra Leone, Liberia, Guinea, and Ivory Coast show that Black Swifts, termed "*Apus (barbatus glanvillei?)*" by Gatter (1988), must be regular in this part of West Africa.

Sierra Leone. In eastern Sierra Leone between Sefadu and the Loma Mts, a flock of about 20 birds was seen on 17 Mar 1984.

Liberia. On Mt Saki, north of Voinjama, just at the Guinean border, on 29 May 1984 (Gatter 1988) a breeding site with several pairs was found in a crack under an overhang on a vertical surface of a granite dome, about 600-700 m a.s.l. (together with C. Steiner).

Ivory Coast. On Mt Tonkui, near Man, at least singles were seen with European Swifts *A. apus* and numerous Alpine Swifts *Tachymarpis melba*, around the television tower on 3 Apr 1991.