



**West African Ornithological Society**  
**Société d'Ornithologie de l'Ouest**  
**Africain**



**Join the WAOS and support  
the future availability of free  
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.  
If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la  
SOOA et soutenez la  
disponibilité future des pdfs  
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.  
Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante  
(2) pour économiser du papier.

### Bibliographie

- LARIVIERE, J. & DUPUY, A.R. (1978) *Sénégal, ses Parcs, ses Animaux*. Fernand Nathan, Paris.
- SCHRICKE, V., TRIPLETT, P., TRÉCA, B., SYLLA, S.I. & DIOP, I. (1991) Dénombrement des Anatidés dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj et ses environs (Janvier 1990). *Bull. mensuel Off. Nat. Chasse Cons. Nat.* 153: 29-34.
- SCHMIDT, K.P. & INGER, R.F. (1961) *Living Reptiles of the World*. Hamish Hamilton, London.

Reçu 12 avril 1994

Bernard Tréca, ORSTOM, B.P. 1386, Dakar, Sénégal

### Corn Bunting *Emberiza calandra* in Mauritania and West Africa

I was birdwatching in the sand dunes about 4 km south of Nouakchott, Mauritania, in the late afternoon of 27 November 1984 when I noticed a small, plump, greyish brown bird with streaked plumage, perched near the top of a small bush amongst the scrub vegetation in the dunes. On closer inspection using 10 x 50 binoculars at a distance of some 50 m I was intrigued to confirm its identity as a Corn Bunting *Emberiza calandra*, a species with which I am familiar in Europe and N Algeria.

The following identification features were noted at the time: plumage generally greyish brown, streaked darker brown on a paler grey throat and chest, the streaks becoming lighter brown on the flanks and belly; back and wings streaked brownish, bill relatively large but short, giving a chunky appearance; moustachial stripe dark brown; ear coverts and crown streaked light brown. Overall it appeared slightly larger and heavier than several other species observed on the same day in adjacent areas, including Tree Pipit *Anthus trivialis*, Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* and female Redstart *Phoenicurus phoenicurus*. On approaching closer, the bird flew away silently towards Nouakchott, without displaying any obvious wing bar or outer tail colour contrast, the flight being somewhat laboured.

Lamarache (1988) describes Corn Bunting as accidental in Mauritania, citing observations in Nouadhibou in 1978 (Trotignon *in* Mahé 1985) and Cap Timirist in 1987. Mahé (1985) quoted southward winter dispersal in Morocco, where the species breeds. One observation is recorded for Senegal (Morel & Morel 1990). E.D.H. Johnson (*in litt.*) caught one at Beni Abbes, SW Algeria, in 1965. The available data suggest that Corn Bunting remains an accidental species in West Africa.

I would like to thank Drs A. Tye and G.J. Morel for commenting on an earlier draft of this note.

### References

- LAMARCHE, B. (1988) Liste commentée des oiseaux de Mauritanie. *Etud. Sahariennes Ouest-Afr.* 1(4). Association des Naturalistes Sahariens et Ouest-Africains, Nouakchott/Paris.
- MAHÉ, E. (1985) *Contribution à l'Étude Scientifique de la Région de Banc d'Arguin 21°20'N/19°20'N*. Thèse, Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, France.
- MOREL, G.J. & MOREL, M.-Y. (1990) *Les Oiseaux de Sénégal*. ORSTOM, Paris.

Received 16 May 1994

Revised 13 August 1994

S.J. Farnsworth

Hammerkop, Frogmill, Hurley, Maidenhead, Berks SL6 5NL, UK.

### Corrigendum

Oiseaux nouveaux pour la République Centrafricaine ou dont les notifications de ce pays sont peu nombreuses. (Germain, M. & Cornet, J.-P., 1994, *Malimbus* 16: 30-51).

Une très préjudiciable lacune bibliographique dont j'assume toute la responsabilité nous a conduits, dans cette note, à considérer la capture près de Bangui, en mai 1978, d'une Hironnelle de rivage *Riparia congica*, comme constituant la première notification de cette espèce en R.C.A.. C'est en réalité à Jehl (1976, *Les oiseaux de l'île Kembé* (R.C.A.). *Alauda* 44: 153-167) que l'on doit de pouvoir étendre la répartition de cette espèce jusqu'au moyen Oubangui, cet auteur en ayant obtenu un exemplaire le 24 mars 1974, sur l'île de Kembé, 25 km en amont de Bangui. Que *Malimbus* et ses lecteurs veuillent bien me pardonner cette malencontreuse erreur.

De plus, la page 31, ligne 6, doit se lire: "... par Carroll dans sa publication de 1988, seule facilement ...". [Le Rédacteur assume toute la responsabilité de cette erreur... A.T.]

Reçu 21 septembre 1994

Max Germain

44 rue Cluseret, 92150 Suresnes, France