



**West African Ornithological Society**  
**Société d'Ornithologie de l'Ouest**  
**Africain**



Join the WAOS and support  
the future availability of free  
pdfs on this website.

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.

Devenez membre de la  
SOOA et soutenez la  
disponibilité future des pdfs  
gratuits sur ce site.

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.

espèce Vulnérable (Stattersfield & Capper 2000). Le site, encore très peu prospecté (trois courtes visites seulement), paraît donc intéressant.

La région de Man (CAMP, Gouessesso, Mont Tonkouï), qui reste assez peu connue sur le plan ornithologique, s'est avérée particulièrement intéressante; plusieurs espèces forestières rares (*Ploceus preussi*, *Campephaga quisqualina*, *Hylia violacea*) s'y sont avérées communes, même dans les plantations de café et de cacao sous ombrage.

Les observations réalisées dans la région de Sassandra, ainsi que dans le PN du Banco et la Forêt classée de l'Anguédédou, ont déjà fait l'objet de publications séparées (Lachenaud 2006a, 2006b).

Les observations citées ici concernent des espèces rarement observées en Côte d'Ivoire, des extensions de répartition, de nouvelles données sur la nidification, ou encore des additions à l'avifaune de sites protégés (PN de la Marahoué, Réserve de Lamto). La nomenclature suit celle de Borrow & Demey (2001). Les abréviations CI, PN et FC signifient respectivement Côte d'Ivoire, Parc National et Forêt Classée.

## Observations

### Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax africanus* Cormoran africain. Nicheur à Grand-Bassam (Tableau 2); nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification de l'espèce en CI.

### Ardeidae

*Ixobrychus sturmii* Blongios de Stürm. Deux oiseaux vus régulièrement dans un marais à Abidjan (Riviera) de nov 1998 à avr 1999, abandonnèrent le site à la suite de défrichements. Rare en CI (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

*Nycticorax nycticorax* Bihoreau gris. Nicheur à Grand-Bassam (Tableau 2). L'espèce étant encore abondante en mai-juin à Abidjan, la population nicheuse est certainement bien plus importante que ne le suggère Thiollay (1985). Dans l'intérieur, où l'espèce est très locale (Thiollay 1985), observé à Bouaké (deux oiseaux, 4 oct 2000) et aux lacs de Yamoussoukro (assez commun pendant la saison des pluies; un juvénile le 9 fév 2002).

*Bubulcus ibis* Héron garde-boeufs. Nicheur abondant à Grand-Bassam (Tableau 2); nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification en CI (cf. Thiollay 1985).

*Ardeola ralloides* Crabier chevelu. Nicheur à Grand-Bassam (Tableau 2); nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification en CI (cf. Thiollay 1985).

*Egretta intermedia* Aigrette intermédiaire. Nicheuse à Grand-Bassam (Tableau 2); nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification en CI. Un oiseau sur le Bandama à Lamto, 2 mai 2002; nouveau pour le site (cf. Thiollay 1972).

*Ardea melanocephala* Héron mélanocéphale. Un oiseau à Sassandra, au bord du fleuve Sassandra, déc 1977. Nouveau pour la région (cf. Lachenaud 2006a).

### Phalacrocoracidae et Ardeidae

Une colonie (Tableau 2) était située au niveau du pont sur le fleuve Comoé, à la sortie de Grand-Bassam en direction d'Assinie. La héronnière est présente à cet endroit depuis 1998 au moins; le fait qu'elle n'ait pas été signalée par les nombreux ornithologues ayant visité la région (notamment Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991) suggère cependant que son installation est récente. En 2000, elle occupait deux îlots situés de part et d'autre du pont sur la Comoé. En 2002, seul l'îlot situé à gauche du pont (en venant d'Abidjan) était occupé; l'îlot à droite, qui abritait le plus grand nombre d'oiseaux (dont la totalité des *Nycticorax*) en 2000, est resté inoccupé, sans doute à cause des perturbations humaines. Une diminution de l'effectif global par rapport à 2000 était nettement visible. En 2002, les espèces indiquées construisaient leurs nids en mai et élevaient des jeunes en juin, à l'exception du *Nycticorax* dont la nidification semble plus tardive (nids observés en juillet 2000; en juin 2002, de nombreux individus transportaient des branchages vers un autre site en bordure du fleuve). Il est probable que d'autres colonies de hérons restent à découvrir dans la région côtière, notamment dans le sud-ouest, qui reste mal connu des ornithologues.

**Tableau 2. Effectifs estimés (nombre de couples) d'une colonie de hérons et cormorans à Grand-Bassam (BB).**

	10 juillet 2000	2 juin 2002
<i>Phalacrocorax africanus</i> Cormoran africain	10	8
<i>Nycticorax nycticorax</i> Héron bihoreau	20	12*
<i>Ardeola ralloides</i> Héron crabier	15	3
<i>Bubulcus ibis</i> Héron garde-boeufs	80	30
<i>Egretta intermedia</i> Aigrette intermédiaire	20	18
<b>Effectif total</b>	<b>145</b>	<b>71</b>

\*Nombre possible: les nids n'étaient pas encore visibles au moment de l'observation.

### Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus* Ibis falcinelle. Deux oiseaux le 9 fév 2002 et trois le 10 fév dans un dortoir de *Bubulcus ibis* aux lacs de Yamoussoukro. Migrateur rare (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991); première observation dans le centre de la CI.

### Anatidae

*Dendrocygna viduata* Dendrocygne veuf. Régulier aux lacs de Yamoussoukro, jan-avr; une observation en août. Thiollay (1985) n'évoque pas sa présence dans le centre de la CI.

### Accipitridae

*Accipiter badius* Epervier shikra. Nid à Abidjan (Riviera), dans la fourche d'un *Ficus benjamina*, mars 2000; nourrissage d'un immature sur le même site, juin 2000.

Second cas de nidification dans la région côtière. Thiollay (1985) ne signalait pas l'espèce de la côte; aujourd'hui bien établie autour d'Abidjan (Rainey & Lachenaud 2002).

*Accipiter ovampensis* Épervier de l'Ovampo. Un oiseau vu à plusieurs reprises au CAMP, août 1990. Nouveau site (cf. Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

*Micronisus gabar* Autour gabar. Un oiseau dans le jardin d'un hôtel à Daloa, fév 1998; deux à Lamto, 7 fév 1999; un à Séfonékaha, 18 déc 2001. Une seule observation antérieure au sud de Bouaké, à Lamto (Thiollay 1985).

*Hieraetus spilogaster* Aigle fascié. Un oiseau, observé longuement et de près, en savane de Lamto, 7 mai 2000. Distingué de l'Aigle d'Ayres *H. ayresi* par sa plus grande taille, le dessous à stries nettement moins denses, l'absence de crête et surtout la tache blanche au niveau des rémiges primaires, très visible en vol. Rare en CI, n'avait pas été observé au sud de Katiola (Thiollay 1985). La région de Lamto étant bien connue, cet oiseau était probablement un égaré.

#### **Falconidae**

*Falco subbuteo* Faucon hobereau. Un immature à Abidjan, 23 sep 2000. Migrateur peu fréquent (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

#### **Phasianidae**

*Coturnix delegorguei* Caille arlequine. Un mâle le 31 mar et un couple le 26 mai 2002 à Yamoussoukro, dans un terrain à herbes rases où la Caille bleue *C. chinensis* a également été observée. Migratrice rare (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

*Ptilopachus petrosus* Poule de roche. Une bande d'environ huit oiseaux sur un affleurement latéritique à quelques km au nord de Séguéla, en 1978. Observation la plus méridionale en CI.

#### **Glareolidae**

*C. temminckii* Courvite de Temminck. Plusieurs à Yamoussoukro, 23 fév 2002. Visiteur rare au sud de 8°N (Thiollay 1985).

*Glareola pratincola* Glaréole à collier. Colonie de c. 100 à Yamoussoukro, dans un terrain à herbes rases, présents fév–oct au moins, mais absents du site en déc. Parades et accouplement observés, 31 mar 2002; un juvénile, 28 juil 2002. Deuxième site de nidification connu en CI (cf. Demey & Fishpool 1991).

#### **Haematopodidae**

*Haematopus ostralegus* Huîtrier pie. Un oiseau à Assinie en compagnie de Barges rousses *Limosa lapponica*, 21 août 2001. Huitième observation en CI, la première en été (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

#### **Charadriidae**

*Vanellus spinosus* Vanneau à éperons. Un oiseau à Lamto, sur les rochers du fleuve Bandama, 2 mai 2002. Nouvelle localité (cf. Thiollay 1972).

#### **Scolopacidae**

*Tringa stagnatilis* Chevalier stagnatile. Un sur la lagune d'Abidjan, oct 2000, et un à Grand-Bassam, 15 sep 2002, tous deux en compagnie d'autres limicoles. Thiollay (1985) le signale de nov–mai seulement.

*Xenus cinereus* Chevalier bargette. Un oiseau au bord de la lagune à Grand-Bassam, 5 oct 2001. Le bord postérieur blanc des ailes, l'absence de tache blanche au croupion, la couleur gris clair du plumage et le bec jaune légèrement recourbé vers le haut ont permis une identification aisée (BB). Seconde observation en CI, la précédente à Abidjan, déc (Thiollay 1985).

*Philomachus pugnax* Combattant varié. Un oiseau à Guessabo, sur le lac de Buyo, 28 avr 2001. Quatrième observation dans l'intérieur (Thiollay 1985, Walsh 1986).

#### **Rhynchopidae**

*Rhynchops flavirostris* Bec-en-ciseaux d'Afrique. Un oiseau à Assinie en oct et déc 2000, en compagnie de nombreuses sternes. Déjà observé à Assinie (Demey & Fishpool 1991, N. Armandy com. pers.); rare en CI (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

#### **Columbidae**

*Columba guinea* Pigeon roussard. Plusieurs observations en périphérie nord-est d'Abidjan (quartier Riviera): groupes de 5–15, sep–oct 1999 et juin 2000; un oiseau, mars 2002. Typique par sa grande taille et sa coloration: dessus châtain vif, tête et dessous gris-bleu, croupion pâle, ailes tachetées de blanc, cou strié, caroncule rouge autour de l'oeil. Ces observations, 600 km au sud de l'aire connue (Thiollay 1985) sont d'autant plus étonnantes que l'oiseau n'est pas habituellement détenu en captivité; l'hypothèse d'échappés semble donc peu probable.

*Streptopelia vinacea* Tourterelle vineuse. Un oiseau à 2 km à l'ouest de Vavoua, août 1990. Deux en savane sèche dans la réserve d'Abokouamékro, 29 déc 2001. Premières observations au sud de Bouaké (Thiollay 1985).

#### **Psittacidae**

*Poicephalus gulielmi* Perroquet à calotte rouge. Observé à Divo et sur la station CNRA au sud-est de la ville où il est abondant. Nouveau site pour cette espèce habituellement rare (Thiollay 1985, Holyoak & Seddon 1990, Demey & Fishpool 1991, Gartshore *et al.* 1995, Waltert *et al.* 1999).

#### **Cuculidae**

*Oxylophus jacobinus* Coucou jacobin. Un oiseau à Danané, 24 fév 2000. Cinq observations en CI dont quatre dans l'extrême nord (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

#### **Caprimulgidae**

*Caprimulgus tristigma* Engoulevent pointillé. Un oiseau sur une colline rocheuse près du CAMP, 3 juil 2002. Nouveau site (cf. Thiollay 1985, Rainey & Lachenaud 2002).

#### **Apodidae**

*Telacanthura melanopygia* Martinet de Chapin. Un oiseau en vol au-dessus de la station CNRA au sud-est de Divo, 31 oct 1999. Nouveau site.

*Tachymarptis aequatorialis* Martinet marbré. Un oiseau survolant un petit marécage près de Férékssédougou, août 1990. Rare en CI; nouvelle localité.

#### **Lybiidae**

*Lybius bidentatus* Barbican à bec denté. Un oiseau à Sassandra, déc 1977. Facilement distingué de *L. dubius* (seule espèce ivoirienne susceptible de confusion) par la

poitrine entièrement rouge et le bec blanchâtre. Première observation sur la côte; non signalé au sud de Lamto (Thiollay 1985).

*L. dubius* Barbican à poitrine rouge. Fréquent à Yamoussoukro, où *L. bidentatus* est également présent, mais plus rare. Deuxième localité au sud de Bouaké: connu plus au sud à Toumodi (Thiollay 1985).

#### **Pittidae**

*Pitta angolensis* Brève d'Angola. Un oiseau capturé par un chasseur sur la station CNRA de Divo, 16 jan 1988 (P. Lachenaud com. pers.). Nouveau site (cf. Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991, Gartshore *et al.* 1995, Waltert *et al.* 1999).

#### **Alaudidae**

*Eremopteryx leucotis* Moinelette à oreillons blancs. Un mâle sur un bowal (plaine latéritique à végétation rase) dans le nord du PN de la Comoé, à quelques kilomètres au sud de Kafolo, 26 déc 2000. Rare en CI (Thiollay 1985, Walsh 1986, Demey & Fishpool 1991); déjà observée dans le sud du parc (Salewski 1997).

#### **Hirundinidae**

*Riparia riparia* Hirondelle de rivage. Une petite bande à Ouangolodougou, août 1982. Observation la plus précoce pour ce migrateur paléarctique peu commun; signalé précédemment oct-avr (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

*Hirundo aethiopica* Hirondelle d'Ethiopie. Découverte dans le sud-est du pays par Demey & Fishpool (1991), aujourd'hui abondante toute l'année à Abidjan. Egalement commune, au moins localement, dans la moitié ouest du pays, où elle n'était pas jusqu'à présent signalée: Sassandra (Lachenaud 2006a), Gagnoa (fév, mars, juil), Man (nombreux oiseaux, avr-mai 2001). Son expansion vers l'ouest (Grimes 1987, Demey & Fishpool 1991) semble donc se poursuivre; pas signalée au Libéria par Gatter (1997).

*Delichon urbicum* Hirondelle de fenêtre. Une au campement du PN de la Marahoué, 18 avr 2000 et une à Man, 1 mai 2001, en compagnie d'autres hirondelles. Migratrice assez rare (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

#### **Campephagidae**

*Campephaga quiscalina* Echenilleur pourpré. Un mâle en forêt très dégradée à Gouessesso, 25 fév 2000; commun dans des plantations de café et de cacao sous ombrage au CAMP entre Man et Biankouma, toujours observé en couples dans les rondes d'insectivores. Nouvelles localités.

#### **Pycnonotidae**

*Andropadus ansorgei* Bulbul d'Ansorge. Deux oiseaux se nourrissant des fruits d'un *Musanga* en compagnie d'un Bulbul à bec grêle *A. gracilirostris*, en FC de la Yaya au nord d'Alépé, 27 jan 2002. Nouveau site; découvert récemment en CI (Demey & Fishpool 1991) mais y semble largement répandu, du moins dans le sud (Gartshore *et al.* 1995, Waltert *et al.* 1999, Rainey & Lachenaud 2002, Lachenaud 2006b).

#### **Turdidae**

*Cossypha cyanocampter* Cossyphé à ailes bleues. Un dans une plantation de café sous forêt très dégradée au CAMP, 4 juil 2002. Nouvelle localité; rare en CI, peu d'observations récentes (Thiollay 1985, Gartshore *et al.* 1995).

**Sylviidae**

[*Acrocephalus rufescens* Rousserolle des cannes. Des *Acrocephalus* de grande taille, produisant un chant identique à celui de cette espèce sur les disques de Chappuis (2000) ont été observés et entendus à plusieurs reprises aux lacs de Yamoussoukro pendant toute l'année (y compris en juil-août). La Rousserolle turdoïde *A. arundinaceus*, seule espèce de taille comparable, a un chant nettement différent et n'est présente en Afrique de l'Ouest que de sep à mai (Borrow & Demey 2001). Néanmoins, l'obtention d'enregistrements serait souhaitable pour confirmer la présence de cette espèce en CI. Thiollay (1985) signale une observation possible sans indication de lieu; citée du Mont Nimba (Yaokokore-Beibro 1997) et de la FC de la Bossématié (Yaokokore-Beibro & Ellenberg 2000) mais aucun détail ne vient appuyer ces observations. Connue du Ghana (Grimes 1987).]

*Hippolais pallida* Hypolaïs pâle. Deux oiseaux le 25 nov 1999, deux le 14 janv 2000 et un en nov 2000, tous sur le même site à Abidjan (Riviera), exploraient le feuillage de l'arbre introduit *Terminalia mantaly*. Un à Vavoua, janv 1978. Ces observations semblent confirmer sa régularité en CI (Demey & Fishpool 1991).

*Sylvia borin* Fauvette des jardins. Un oiseau dans un jardin à Sassandra, juil 1990. Nouveau pour la région (cf. Lachenaud 2006a).

*Hyliota violacea* Hyliota à dos violet. Commun au CAMP en forêt très dégradée, en couples ou groupes de 2-3 couples, accompagnant les rondes d'insectivores. Nouvelle localité.

**Muscicapidae**

*Myioparus plumbeus* Gobemouche mésange. Un oiseau en forêt dégradée à Bécédi, mai 1983. Rare dans le sud du pays (cf. Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).

**Platysteiridae**

*Bias musicus* Bias musicien. Répandu dans la zone forestière, observé à Gaoulou près de Sassandra (Lachenaud 2006a), en FC de l'Anguédédou (Lachenaud 2006b), à Abidjan, Bingerville, Dabou, Gagnoa, Divo (abondant sur la station CNRA, groupes de 20-30), Vavoua, et au CAMP. Le faible nombre d'observations obtenues par Demey & Fishpool (1991) par rapport à Thiollay (1985) ne semble donc pas refléter un réel déclin de l'espèce, qui par ailleurs est nettement favorisée par les défrichements.

**Timaliidae**

*Turdoides reinwardti* Cratérope à tête noire. Observé à Séfonkaha, mars, déc. Nouvelle localité; plus fréquent dans les savanes sud-guinéennes (Thiollay 1985) que dans le nord (Demey & Fishpool 1991).

*Phyllanthus atripennis* Phyllanthe capucin. Un petit groupe à Sassandra, juil 1990. Deuxième localité connue sur la côte (cf. Thiollay 1985).

**Nectariniidae**

*Anabathmis reichenbachii* Soui-manga de Reichenbach. Régulier à Sassandra (Lachenaud 2006a); un oiseau à San Pedro dans un jardin d'hôtel, attiré par les fleurs d'*Azadirachta indica*, 3 juin 2001. Premières observations en CI à l'ouest d'Azagny (Eccles 1985, Demey & Fishpool 1991); l'espèce existe, encore plus à l'ouest, sur la côte libérienne (Gatter 1997).

*Cyanomitra verticalis* Soui-manga à tête verte. Un oiseau en savane boisée dans le PN de la Marahoué, 30 mars 2002. Nouveau site (cf. Christy & Schulenberg 1999).

*C. cyanolaema* Soui-manga à gorge bleue. Fréquent au CAMP, en forêt de bord de rivière. Non signalé en CI au nord de Daloa (Thiollay 1985), bien qu'il soit répandu au Libéria jusque dans l'extrême nord (Gatter 1997).

#### **Sturnidae**

*Poeoptera lugubris* Rufipenne à queue étroite. Un oiseau en FC de Mopri, 1 nov 1999; non mentionné de ce site par Gartshore *et al.* (1995).

*Onychognathus fulgidus* Rufipenne de forêt. Observé à Abidjan (trois en vol au-dessus du golf, 13 mai 1998), N'Douci (un, 5 déc 1999) et au CAMP (c. 10, le 1 juil 2001). Nouvelles localités.

*Lamprotornis splendidus* Choucador splendide. Observé à Yamoussoukro (fréquent) et dans le PN d'Abokouamékro (un en savane sèche, 29 déc 2001). Nouveaux sites pour cette espèce surtout côtière; signalé précédemment dans l'intérieur (Thiollay 1972, Rainey & Lachenaud 2002).

*L. caudatus* Choucador à longue queue. Dans le PN de la Comoé: deux au confluent Comoé-Kongo dans le sud du parc (8°48'N, 3°46'W), dans une plaine très ouverte avec des buissons de *Dichrostachys cinerea*, 20 oct 1995 (V. Salewski com. pers.); deux en limite nord du parc à l'ouest de Kafolo, 26 déc 2000. Quatre au barrage de Sambakaha, près de Séfonékaha, 19 déc 2001. Quatre observations précédentes en CI (Thiollay 1985).

#### **Ploceidae**

*Ploceus preussi* Tisserin de Preuss. Deux à Lieupleu (26 km au sud-ouest de Danané), explorant les fougères épiphytes *Platynerium* à 20–25 m de haut dans les arbres d'ombrage d'une plantation de cacao, 24 fév 2000. Fréquent au CAMP en forêt très dégradée; souvent noté dans les rondes d'insectivores. Nouveaux sites (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991, Gartshore *et al.* 1995, Waltert *et al.* 1999).

#### **Estrildidae**

*Nigrita fusconotus* Nigrette à ventre blanc. Commun à Vavoua, 1977–9. Observé et entendu à plusieurs reprises en forêt très dégradée au CAMP. Nouvelles localités.

*Estrilda troglodytes* Astrild cendré. Un à Abidjan (Riviera), en compagnie d'autres estrildidés, 19 déc 1998. Première observation sur la côte depuis 1984 (Demey & Fishpool 1991). Deux à Fakaha, au sud de Korhogo, 19 avr 1999; nouveau site.

*Lagonosticta rubricata* Amarante foncé. Régulier dans les champs et les broussailles autour de Yamoussoukro, toute l'année mais plus fréquent en saison sèche. Seulement au nord de 8°N d'après Thiollay (1985); récemment signalé plus au sud dans le PN de la Marahoué (Rainey & Lachenaud 2002) et à Lamto (Salewski 1999).

*Amandava subflava* Bengali zébré. Un petit groupe au bord de la rivière FéréDougouba, près de la frontière avec la Guinée, août 1982. Troisième localité connue en Côte d'Ivoire, et la plus méridionale.

*Lonchura fringilloides* Capucin pie. Deux observations en limite sud du PN de la Marahoué: un oiseau, 17 avr 2000; un petit groupe, 30 mar 2002. Nouveau site (cf. Christy & Schulenberg 1999)

**Viduidae**

*Vidua chalybeata* Combassou du Sénégal. Noté à Vavoua, août 1990. Un mâle vu régulièrement à Yamoussoukro en compagnie de son espèce hôte, l'Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*. Observations les plus méridionales en CI (cf. Payne 1982).

**Conclusion**

Sept espèces ont été observées au sud de leur aire connue (voir Salewski *et al.* 2001): *Hieraaetus spilogaster*, *Ptilopachus petrosus*, *Columba guinea*, *Streptopelia vinacea*, *Lybius bidentatus*, *Amandava subflava* et *Vidua chalybeata*. Dans le cas de *Columba guinea*, il s'agit vraisemblablement d'une extension récente: l'espèce est trop remarquable pour avoir pu échapper aux nombreux ornithologues ayant visité la région d'Abidjan. A l'exception d'*Hieraaetus spilogaster* qui pourrait être un visiteur accidentel, les autres espèces ont été découvertes dans des localités mal prospectées, il n'est donc pas possible de déterminer si leur présence y est récente.

La nidification de quatre espèces, *Phalacrocorax africanus*, *Ardeola ralloides*, *Bubulcus ibis* et *Egretta intermedia*, est signalée pour la première fois dans le pays.

**Remerciements**

Nous remercions Nathalie Armandy, Philippe Lachenaud et Volker Salewski pour nous avoir confié certaines de leurs observations, Ron Demey et Lincoln Fishpool qui ont relu l'article, ainsi que Nik Borrow, Robert Dowsett et Françoise Dowsett-Lemaire pour leurs commentaires éclairés.

**Bibliographie**

- BORROW, N. & DEMEY, R. (2001). *Birds of Western Africa*. Christopher Helm, London.
- CHAPPUIS, C. (2000) *African Bird Sounds*, vol. 2. National Sound Archive, London.
- CHRISTY, P. & SCHULENBERG, T.S. (1999) The avifauna of the Parc National de la Marahoué, Côte d'Ivoire. Pp. 60–65 in SCHULENBERG, T.S., SHORT, C.A. & STEPHENSON, P.J. (éds) *A Biological Assessment of the Parc National de la Marahoué, Côte d'Ivoire*. RAP working papers 13, Conservation International, Washington.
- DEMEY, R. & FISHPOOL, L.D.C. (1991) Additions and annotations to the avifauna of Côte d'Ivoire. *Malimbus* 12: 61–86.
- DEMEY, R. & FISHPOOL, L.D.C. (1994) The birds of Yapo Forest, Ivory Coast. *Malimbus* 16: 100–122.
- ECCLES, S. D. (1985) Reichenbach's Sunbird *Nectarinia reichenbachii* new to Ivory Coast. *Malimbus* 7: 140.

- GARTSHORE, M.E., TAYLOR, P.D. & FRANCIS, I.S. (1995) *Forest Birds in Côte d'Ivoire*. Study Rep. 58, BirdLife International, Cambridge.
- GATTER, W. (1993) The status of the Black Swift *Apus barbatus* in western West Africa. *Malimbus* 15: 90–91.
- GATTER, W. (1997) *Birds of Liberia*. Pica Press, Mountfield.
- GRIMES, L. G. (1987) *The Birds of Ghana*. British Ornithologists' Union, Tring.
- HOLYOAK, D.T. & SEDDON, M.B. (1990) Notes on some birds of the Ivory Coast. *Malimbus* 11: 146–148.
- LACHENAUD, O. (2004) Notes sur l'Echenilleur caronculé *Lobotos lobatus*. *Malimbus* 26: 19–23.
- LACHENAUD, O. (2006a). Les oiseaux de la région de Sassandra, Côte d'Ivoire. *Malimbus* 28: 18–34.
- LACHENAUD, O. (2006b) Les oiseaux du Parc National du Banco et de la Forêt Classée de l'Anguédédou, Côte d'Ivoire. *Malimbus* 28: 107–133.
- PAYNE, R.B. (1982) Species limits in the indigobirds (Ploceidae, *Vidua*) of West Africa: mouth mimicry, song mimicry, and a description of new species. *Misc. Publ. Mus. Zool., Univ. Michigan* 162: 1–96.
- RAINEY, H.J. & LACHENAUD, O. (2002) Recent birds observations from Côte d'Ivoire. *Malimbus* 24: 23–37
- SALEWSKI, V. (1997) Notes on some bird species from Comoé National Park, Ivory Coast. *Malimbus* 19: 61–67.
- SALEWSKI, V. (1999) *Bird Research in Lamto between September 1998 and April 1999 with Special Consideration of Palaearctic Passerine Migrants*. Institute for Avian Research "Vogelwarte Helgoland", Wilhelmshaven, non publié.
- SALEWSKI, V., RAINEY, H., & BAIRLEIN, F., (2001) Have birds shifted their range limits southwards in Côte d'Ivoire, West Africa?. *Bull. Afr. Bird Club* 8: 117–120.
- STATTERSFIELD, A.J. & CAPPER, D.R. (éds) (2000) *Threatened Birds of the World*. Lynx, Barcelona.
- THIOLLAY, J.-M. (1972) L'avifaune de la région de Lamto (moyenne Côte d'Ivoire). *Ann. Univ. Abidjan* E (4, 1): 5–132.
- THIOLLAY, J.-M. (1985) The birds of Ivory Coast: status and distribution. *Malimbus* 7: 1–59.
- WALSH, J. F. (1986) Notes on the birds of Ivory Coast. *Malimbus* 8: 89–93.
- WALTERT, M., YAOKOKORE-BEIBRO, K.H., MÜHLENBERG, M. & WAITKUWAIT, W.E. (1999) Preliminary check-list of the birds of the Bossematié area, Ivory Coast. *Malimbus* 21: 93–109.
- YAOKOKORE-BEIBRO, K.H. (1997) *Inventaire Préliminaire de l'Avifaune des Parcs Nationaux des Iles Ehotilé et du Mont Péko, et de la Réserve du Mont Nimba, Côte d'Ivoire*. WWF, Abidjan.
- YAOKOKORE-BEIBRO, K.H. & ELLENBERG, H. (2000) A contribution to the study of the avifauna of the Bossematie Forest (Abengourou/Côte d'Ivoire). The future of Bossematie Forest: current status. *Ostrich* 71: 292–294.