

- GOODMAN, S.M. & MEININGER, P.L. (1989) *The Birds of Egypt*. Oxford University Press, Oxford.
- ISENMANN, P. (2006) *Les Oiseaux du Banc d'Arguin*. PNBA, Nouakchott, Mauritanie.
- ISENMANN, P. & MOALI, A. (2000) *Oiseaux d'Algérie / Birds of Algeria*. SEOF, Paris.
- ISENMANN, P., GAULTIER, T., EL HILI, A., AZAFZAF, H., DLENSI, H. & SMART, M. (2005) *Oiseaux de Tunisie / Birds of Tunisia*. Société d'Etudes Ornithologiques de France, Paris.
- MOREL, G.J. & MOREL, M-Y. 1990. *Les Oiseaux de Sénégal*. ORSTOM, Paris.
- THÉVENOT, M., VERNON, R. & BERGIER, P. (2003) *The Birds of Morocco*. Checklist 20, British Ornithologists' Union, Tring.
- WETLANDS INTERNATIONAL. (2006) *Waterbird Population Estimates – Fourth Edition*. Wetlands International, Wageningen.

Received 20 September 2010

Revised 20 December 2010

Clive R. Barlow¹ & Tim Dodman²

¹Hanou Avenue, Brufut Gardens, The Gambia <birdsofthegambia@hotmail.com>

²Hundland, Papa Westray, Orkney KW17 2BU, U.K.

Un oiseau nouveau au Burundi: le Moineau domestique *Passer domesticus*

Le Moineau domestique *Passer domesticus* est une espèce d'origine paléarctique, notée dans différents pays de l'Ouest africain jusqu'au Tchad, et devenue commune en Afrique australe (Anderson 2006, Summers-Smith 2009). La sous-espèce *indicus* introduite à Durban en Afrique du Sud vers les années 1900 a connu par la suite une expansion vers tous les pays du sud du continent jusqu'en République Démocratique du Congo, en Tanzanie et jusqu'au Kenya (Anderson 2006). Il est donc observé dans les pays limitrophes du Burundi. Dans la RDC, l'oiseau se trouve dans certaines régions du Sud Est, aux confins de la Tanzanie (Anderson 2006). Dans ce pays, il a été introduit à partir de Dar-es-Salaam en 1984 en provenance de la Zambie et a continué son expansion vers l'Ouest (<http://tanzaniabirdatlas.com/maps/distribution-maps/1204.pdf>, consulté 19 jan 2011). Dès 2008, ce moineau a été signalé au Rwanda, à Gitarama et aux portes de la ville de Kigali (Anonymous 2009, Nsabagasani 2009).

Le Moineau domestique, qui n'avait jamais été signalé sur le territoire burundais (Schouteden 1966) a été observé au moins à trois endroits différents en 2009. La reconnaissance de cette espèce a été faite en notant la calotte grise des mâles, une barre alaire blanche et une bavette noire descendant vers la gorge (Sinclair & Ryan 2003), patron de plumage très distinct de celui du Moineau à tête grise *Passer griseus*.

Dans la plaine de la Rusizi au nord-ouest du Burundi, dans le village de Gatumba, province de Bujumbura Rural (3°20'S, 29°15'E), j'ai vu régulièrement trois couples en mars, soit perchés sur les branches des arbres, soit volaient autour des habitations ou encore se trouvaient dans la cour des maisons. Ce village est constitué de maisons de paysans bordées au sud par le delta de la Réserve Naturelle Gérée de la Rusizi, à l'est, au nord et à l'ouest par les cultures de riz et de tomates. Dans le village, on trouve quelques arbres, notamment des *Eucalyptus* et des Manguiers *Mangifera indica*. A l'occasion d'une excursion organisée par l'Association Burundaise pour la Protection des Oiseaux, nous avons vu un couple de Moineaux domestiques dans les bananeraies situées autour des habitations dans la commune de Mpanda (3°14'S, 29°24'E), province de Bubanza, le 9 mai. Dans cette commune, le milieu est rural et agricole. A proximité des habitations, les bananiers sont dominants, suivis du manioc, du maïs et des haricots. A quelques mètres, on y trouve de grands champs de riz. Enfin, deux mois plus tard (le 4 juillet), j'ai observé une dizaine d'individus mâles et femelles qui entraient et sortaient du haut du toit d'une maison dans un des quartiers nord de la mairie de Bujumbura (3°21'S, 29°23'E). C'est un quartier nouvellement construit dont certaines maisons sont achevées et d'autres sont encore en construction. Il n'y a pas de végétation à proximité sauf l'un ou l'autre arbre se trouvant en bordure de la route voisine. Je n'ai pas pu remarquer quelqu'indice d'activité de reproduction. Il est donc possible que certains immigrants cherchent à s'établir au Burundi. Le Moineau domestique devient donc le second *Passer* à être recensé au Burundi après le Moineau à tête grise. Il est possible que ces deux moineaux puissent être concurrents et il serait intéressant de surveiller le domestique, son extension géographique et, le cas échéant, comparer son alimentation à celle du Moineau à tête grise.

Bibliographie

- ANDERSON, T. R. (2006) *Biology of the Ubiquitous House Sparrow: from genes to populations*. Oxford University Press, Oxford.
- ANONYMOUS (2009) House Sparrow in Rwanda. *Birdlife Africa Newsletter* 11(2.): 13.
- NSABAGASANI, C. (2009) in Recent reports. *Bull. Afr. Bird Club* 16: 107.
- SCHOUTEDEN, H. (1966) La faune ornithologique du Burundi. *Mus. Roy. Afr. Centrale Doc. Zool.* 11: 1–81.
- SINCLAIR, I. & RYAN, P. (2003) *A Comprehensive Illustrated Field Guide to the Birds of Africa South of the Sahara*. Struik, Cape Town.
- SUMMERS-SMITH, J.D. (2009) Family Passeridae (Old World sparrows). Pp. 760–813 in DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & CHRISTIE, D. (eds) *Handbook of the Birds of the World*, vol. 14.. Lynx, Barcelona.

Reçu 16 décembre 2010;

Revu 21 janvier 2011

Régine Pacis Nasasagare

Université de Liège, Belgique et Ecole Normale Supérieure, Burundi <rpnas@yahoo.fr>